

**GGD Update: Start RSV seizoen en de mogelijkheid preventie infecties & webinar RVP
28 januari****In dit bericht:**

- Start RSV seizoen en de mogelijkheid van preventie van RSV-infecties
- Uitnodiging voor webinar voor huisartsen over Rijksvaccinatieprogramma op 28 januari 2025

In RSV-surveillancebronnen is sprake van een toenemend aantal RSV-infecties. Ook zijn er meldingen van opnames van kleine kinderen in sommige ziekenhuizen ten gevolge van RSV-bronchiolitis. Daarmee is er sprake van de start van het RSV-seizoen. Vanaf nu tot vermoedelijk maart/april 2025 worden verhoogde viruscirculatie en meer infecties verwacht. Intra- en extramuraal werkzame artsen wordt geadviseerd om alert te zijn op jonge kinderen en anderen met passende klachten. Het RIVM heeft hierover een [nieuwsbericht](#) op haar website geplaatst.

Passieve immunisatie met nirsevimab nog niet mogelijk dit RSV-seizoen

De [Gezondheidsraad](#) heeft dit jaar geadviseerd om alle kinderen in hun eerste levensjaar door middel van passieve immunisatie met antistoffen (eenmalige intramusculaire injectie met het monoklonale antistoffenproduct nirsevimab) te beschermen tegen RSV-infecties. De staatssecretaris van VWS heeft dat advies overgenomen. Het streven is om deze immunisatie vanaf het najaar van 2025 in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen. Nirsevimab is niet regulier beschikbaar in Nederland. Wel kunnen kinderartsen volgens hun richtlijnen voor specifieke categorieën zuigelingen palivizumab (maandelijks injecties van monoklonale antistoffen gedurende het RSV-seizoen) voorschrijven. Nirsevimab is een langwerkend antistof. De bescherming is direct aanwezig tot > 5 mnd. Palivizumab werkt slechts 1 maand. Dit wordt momenteel door kinderartsen voorgeschreven aan neonaten geboren voor een zwangerschapsduur van 32 weken en op medische indicatie. Palivizumab geeft vaker bijwerkingen dan nirsevimab. Het moet maandelijks herhaald worden en is relatief kostbaar. Dit maakt dat Palivizumab geen haalbare optie is voor immunisatie op eigen verzoek.

Maternale vaccinatie tegen RSV-infecties bij baby's

Een alternatieve methode voor de bescherming tegen RSV-infectie van de pasgeborene is de vaccinatie van zwangeren tussen week 24 en week 36 van de zwangerschap met het bivalente, recombinant RSV-vaccin (Abrysvo). Dit vaccin wordt niet vergoed, dus het vaccin en eventuele consultatie-/toedieningskosten moeten zelf betaald worden door de zwangere.

Maternale vaccinatie is voldoende werkzaam in het tegengaan van een (ernstige) RSV-infectie en ziekenhuisopname bij kinderen tot 6 maanden oud: de vaccineffectiviteit gedurende de eerste 6 maanden wordt geschat op ca. 70%. Na maternale vaccinatie zijn minimaal 2 weken nodig om maternale antistoffen tegen RSV te maken. Via passage van de placenta komen deze bij het ongeboren kind om zo na de bevalling effectief te kunnen zijn. Maternale vaccinatie tijdens het geïndiceerde interval (week 24-36) zal dus alleen effect kunnen hebben als:

- er rekening wordt gehouden met het kunnen bereiken van beschermende antistofconcentraties in de pasgeborenen: vaccinatie minimaal 2 weken voor de bevalling;

- kinderen geboren worden tijdens het RSV-seizoen. Maternale RSV-vaccinatie aan het eind of na het RSV-seizoen is dus niet zinvol.

Uit onderzoek blijkt verder dat de vaccinatie de baby beter en langer beschermt als een zwangere deze na de 30e week van de zwangerschap krijgt.

Voor meer inhoudelijke informatie zie de [factsheet RSV-vaccinatie/immunisatie](#).

Maternale RSV-vaccinatie via GGD of huisarts

Het is voor zwangeren mogelijk om zich te laten vaccineren bij het Vaccinatiebureau van GGD Amsterdam. Via de GGD website [Vaccinaties op maat](#) kunnen zij zelf een afspraak maken hiervoor. Op onze website staat ook een [overzicht van kosten](#) voor vaccinatie bij het GGD Vaccinatiebureau.

Uiteraard kan een huisarts ook zelf het vaccin voorschrijven. Huisartsen zijn via de NHG-website ook geïnformeerd over de mogelijkheid van maternale vaccinatie tegen RSV, zie de pagina [Immunisatie tegen Respiratoir syncytieel virus \(RSV\)](#). Wij adviseren om eventueel te overleggen met de apotheek over levering en kosten.

Vaccinatie tegen RSV bij ouderen

RSV herinfecties komen regelmatig voor bij ouderen. Er zijn op dit moment op de Nederlandse markt twee RSV-vaccins beschikbaar voor ouderen (Abrysvo en Arexvy) en een derde is recent goedgekeurd door de EMA (mRESVIA). Vaccinatie is eventueel op eigen verzoek beschikbaar. Er is nog geen informatie beschikbaar over eventuele preferentie voor één van deze vaccins en de noodzaak van periodieke hervaccinatie. De verwachting is dat er in Q1 2025 een advies van de Gezondheidsraad komt over de inzet van RSV-vaccinaties voor ouderen. Bij GGD Amsterdam is op dit moment alleen het vaccin Abrysvo opgenomen in het assortiment.

Diagnostiek naar RSV en andere respiratoire virussen bij Streeklaboratorium GGD Amsterdam

Bij patiënten met respiratoire klachten die kunnen passen bij een RSV infectie is het mogelijk om respiratoire diagnostiek uit te voeren. De diagnostische test zal altijd gecombineerd plaatsvinden met influenza A/B en SARS-CoV-2. Verdere informatie omtrent welke materialen en afname-instructies kunt u terecht op het [Diagnostisch Vademecum van het GGD streeklaboratorium \(Respiratoir syncytieel virus \(RSV\)\)](#). Mocht er sprake zijn van een voorafgaande RSV vaccinatie dan kunt u dat aangeven bij klinische gegevens.

Intercollegiaal contact

Infectieziektebestrijding:

- Op werkdagen (ma t/m vrij tussen 08:30 – 17:00 uur) kunt u contact opnemen met het team Algemene Infectieziekten: 020-5555 566 (intercollegiaal nummer AIZ).
- Buiten kantoortijden bij vragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de dienstdoende arts infectieziektebestrijding via de meldkamer: 020 555 5555 (7x5).

Streeklaboratorium:

- Op werkdagen tijdens kantooruren is de arts-microbioloog Streeklaboratorium GGD Amsterdam beschikbaar voor intercollegiaal overleg: 020 5555 293 (intercollegiaal nummer Streeklab).
- Op werkdagen na 17.00u, in het weekend of op feestdagen kan voor vragen die niet tot de eerstvolgende werkdag kunnen wachten hetzelfde nummer gebeld worden.

Overige laboratoria

- Bent u aangesloten bij een ander laboratorium dan het Streeklaboratorium Amsterdam, neem dan bij vragen aan de arts-microbioloog contact op met uw eigen laboratorium.

Deze nieuwsbrief wordt aan huisartsen verspreid via de huisartsenalliantie. Tevens aan huisartsen die aangegeven hebben direct de berichten van de GGD te willen ontvangen.

Mocht u op deze verzendlijst willen, stuur dan een mail met uw emailadres onder vermelding van *GGD Update* aan infectieziekten@ggd.amsterdam.nl.

Alle berichten van de GGD voor huisartsen worden ook geplaatst op de website van de GGD:

ggd.amsterdam.nl/huisarts